UrgoTul

Interface lipido-colloïde non occlusive

Urgotul

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
		Nombre UCD/Boîte	*Nombre UCD*	*Nombre boîtes*
508537	Petit : 5 x 5 cm	10	300	30
508538	Standard : 10 x 10 cm	10	160	16
508513	Grand : 15 x 20 cm	10	140	14
508540	Large : 10 x 40 cm	10	100	10

Lire attentivement la notice

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

UrgoTul

DESCRIPTION

COMPOSITION : **Urgotul** est issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.
Urgotul est une interface lipido-colloïde non adhésive, non occlusive, constituée d'une trame polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose), d'huile de paraffine, de vaseline et de polymères.
PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.
MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES

- Au contact des exsudats de la plaie, les particules hydrocolloïdes se gélifient et interagissent avec la composante vaselinée d'**Urgotul** pour former une interface lipido-colloïde de contact qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel (cicatrisation en milieu humide).

Il en résulte des propriétés spécifiques :
- maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation,
- retrait atraumatique pour les tissus néoformés,
- caractère indolore du renouvellement de pansement pour le patient,
- respect de la peau péri-lésionnelle.

Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, **Urgotul** n'adhère ni à la plaie, ni à son pourtour : les renouvellements de pansements sont donc indolores pour le patient et atraumatiques pour la plaie.
- Souple et très conformable, **Urgotul** épouse toute localisation anatomique difficile.

INDICATIONS

- **Urgotul** est indiqué pour le traitement des plaies aiguës (brûlures, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires), des plaies du pied diabétique, des plaies chroniques (escarres, ulcères) au stade de bourgeonnement et d'épidermisation, et des plaies d'épidermolyse bulleuse congénitale.
- Souple et très conformable, **Urgotul** est tout particulièrement indiqué dans le recouvrement des plaies anfractueuses ou de localisations difficiles ainsi que pour le méchage des plaies creuses.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :
- Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application d'**Urgotul.**
- Retirer les ailettes de protection d'**Urgotul.**
- Appliquer directement **Urgotul** sur la plaie.
  Urgotul peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter la taille du pansement à la plaie.
- Recouvrir **Urgotul** d'un pansement secondaire : compresses stériles maintenues par une bande extensible ou un sparadrap multi-extensible ou un filet tubulaire.
- Les renouvellements **d'Urgotul** seront effectués tous les 2 à 4 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution.
- **Urgotul** peut être laissé en place jusqu'à 7 jours sous compression multicouches (type **UrgoK2**) dans l'ulcère de jambe d'origine veineuse, en cas de prescription associée et justifiée par l'évolution clinique de la plaie.
- Dans les cas des plaies d'épidermolyse bulleuse congénitale, le renouvellement se fera tous les 1 à 3 jours.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
- **Urgotul** adhère aux gants chirurgicaux en latex. Aussi, est-il recommandé d'humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter, dans ce cas, la manipulation d'**Urgotul.**
- En présence de signes cliniques d'infection locale, l'instauration d'un traitement préalable avec une interface anti-bactérienne de type **Urgotul Ag** est préconisée.
- En cas de plaie profonde, anfractueuse ou fistuleuse, laisser une partie du pansement **Urgotul** visible et accessible à l'extérieur de la plaie.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Stocker **Urgotul** à l'abri de l'humidité, de la chaleur (température inférieure à 25°C).

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed) .
Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60 % + Mutuelle 40 %).

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*